

## GUIA PARA EL CONTROL DE ENTEROBACTERIAS RESISTENTES A CARBAPENEM

### Resumen De Estrategias De Prevención Para Instituciones De Cuidados Agudos Y De Cuidados Prolongados

*Center for emerging and zoonotic infectious diseases- Division of healthcare quality promotion. CDC. 2012 CRE Toolkit*

#### Medidas centrales para todas las Instituciones de cuidados agudos y de cuidados prolongados

##### 1. Higiene de manos

- Promover la higiene de manos
- Monitorear la adherencia a la higiene de manos y devolver la información a los involucrados
- Asegurar el acceso a los elementos para la higiene de manos

##### 2. Precauciones de Contacto

Instituciones de cuidados agudos:

- Indicar precauciones de contacto a los pacientes colonizados o infectados con Enterobacterias productoras de carbapenemasa
- Puede utilizarse aislamiento de contacto preventivo para pacientes transferidos de lugares de alto riesgo
- Educar al personal de salud sobre las precauciones de contacto
- Monitorear la adherencia a las precauciones de contacto y devolver la información a los involucrados
- No se pueden hacer recomendaciones sobre la discontinuación de las precauciones de contacto
- Desarrollar protocolos de laboratorio para notificar a los médicos y profesionales de control de infecciones sobre los potenciales pacientes con Enterobacterias productoras de carbapenemasa

Instituciones de cuidados prolongados

- Ubicar a los residentes colonizados o infectados con Enterobacterias productoras de carbapenemasa que tienen alto riesgo de transmisión en aislamiento de contacto; para pacientes con bajo riesgo de transmisión utilizar las precauciones estándares.

##### 3. Cohorte de pacientes y personal

- Cuando es posible realizar cohorte de pacientes colonizados o infectados con Enterobacterias productoras de carbapenemasa, aun si los pacientes pueden ser ubicados en habitaciones individuales
- Si el número de habitaciones individuales es limitado, reservar esas para pacientes con alto riesgo de transmisión (por ejemplo: incontinencia)

##### 4. Minimizar el uso de dispositivos invasivos

##### 5. Promover el uso racional de antibióticos

##### 6. Búsqueda a través de hisopados

- Buscar en pacientes cuando exista nexo epidemiológico con pacientes colonizados o infectados no reconocidos y/o realizar estudios de prevalencia en unidades donde no hay pacientes con Enterobacterias productoras de carbapenemasa reconocidos

## Medidas suplementarias para instituciones con transmisión de Enterobacteria productoras de carbapenemasa

### 1. Realizar vigilancia activa

- Hisopar a pacientes de alto riesgo en la admisión o en la admisión y periódicamente durante la internación. Puede aplicarse aislamiento de contacto preventivo mientras se esperan los resultados de los cultivos de vigilancia
- Considerar hisopar a los pacientes transferidos de instituciones conocidas por tener Enterobacterias, en la admisión

### 2. Baño con clorhexidina

- Bañar a los pacientes con clorhexidina 2%